

Ces deux espèces appartiennent au groupe que j'ai désigné sous le nom de *Paragapostemon*.

3. **H. (Augochl.) notares** ♀, nov. sp.

Abdomen, trunci latera et pars postica œneo-viridia, facies et scutellum cupreo micantia, mesonotum nigrescens plus minus hinc illinc cupreo niteus. Antennae, tegulae, tibiae posticae et tarsi omnes nigri.

Tête, tronc et ventre garnis de petits poils dressés, peu épais, gris-roussâtre sur la face, bruns au vertex, noirâtres sur le disque du mésonotum, blancs sous le ventre, fauves sous le prototarse 3; brosse tibiale obscure. Aile grisâtre à nervures foncées; éperon de la patte 3 blond à 3 épines. Aire dorsale du segment médiaire grande, tout entière occupée par des stries très fines, très nombreuses, devenant obsolètes en arrière.

Longueur, 9 millimètres : aile, 7 millim. 5. 1 ♀.

4. **H. (Augochl.) Joannisi** (Vach., in *Misc. entomol.*, 1904, p. 19 et 24). 2 ♂.

5. **Sphcodes equator** ♂, nov. sp.

Niger, mandibulis dimidio apicali testaceis.

Aile hyaline, nervures brunes, cellule cubitale 2 plus étroite le long de la nervure radiale. Antennes courtes, l'article 4 à peine plus long que 3. Mésonotum et scutellum brillants, à ponctuation presque fine, assez dense. Aire dorsale du segment médiaire en croissant, tout entière occupée par des rides longitudinales grosses. Abdomen brillant à pointillé visible seulement sous un fort grossissement, à dépressions lisses.

Longueur, 4 millim. 75; aile, 3 millim. 5. 1 ♂.

Le tout au Muséum de Paris.

UN NOUVEAU GENRE DU GROUPE DES NATALICOLARIA (TESSARATOMINÆ)
DE L'INDE MÉRIDIONALE (HÉMIPTÈRES),

PAR M. JOANNY MARTIN.

Le groupe des *Natalicolaria* (Horwath) n'était, jusqu'à présent, répandu qu'en Afrique, où il semblait en être l'une des caractéristiques. Le genre que nous faisons connaître étend la répartition de ce groupe jusque dans l'Inde, et il est permis de croire que l'on trouvera quelques-uns de ses représentants à Madagascar où ils sont encore inconnus.

Empysarus nov. g.

Corps plan, ovale, tête foliacée plane, triangulaire, un peu plus large que longue, à sommet arrondi, à lobes latéraux beaucoup plus longs que le tylus et contigus. Tubercules antennifères inermes, non visibles en dessus. Bucculae peu élevées, parallèles, un peu plus hautes en avant qu'en arrière où elles diminuent insensiblement. Ocelles un peu plus distants entre eux que des yeux. Rostre court, atteignant les hanches antérieures, à premier article un peu plus court que les bucculae, le second de longueur subégale aux deux autres réunis. Antennes courtes, robustes, à cinq articles, premier article loin d'atteindre le sommet de la tête, le second un peu plus long que le troisième, celui-ci subégal au premier, cylindrique, indistinctement sillonné; quatrième plus étroit à la base qu'au sommet, sillonné en dessus et en dessous, un peu plus long que le second article; cinquième de longueur égale au précédent, fusiforme, sillonné dans sa moitié basilaire. Pronotum à partie antérieure plane assez brusquement déclive à partir d'une ligne tirée des angles huméraux, à bords latéraux convexes non développés, tranchants, unis, à angles latéraux postérieurs très obtus. Écusson équilatère, faiblement convexe, à frein s'étendant presque jusqu'au sommet, celui-ci faiblement développé à bords parallèles, tronqué presque droit. Bord costal du corium droit, lisse, vers la base, puis formant un angle obtus, bord apical du corium très largement arrondi. Membrane à nervures longitudinales nombreuses, partant de la base. Prosternum avec une impression longitudinale assez large à bords un peu relevés; mésosternum muni d'une carène faiblement épaissie, assez élevée, et de hauteur égale sur toute sa longueur; métasternum à carène élevée en croix, étroite longitudinalement et transversalement convexe, s'avancant en une pointe aiguë jusqu'au devant des hanches intermédiaires, munie en arrière, d'une échancrure étroite et profonde. Abdomen, presque circulaire chez le mâle, en ovale arrondi chez la femelle, plus large que les hémélytres; connexivum largement ditaté, bords externes des segments continus les uns avec les autres. Second segment de l'abdomen développé en une pointe étroite, aiguë, s'engageant dans l'échancrure basilaire de la carène métasternale. Pattes courtes, inermes, à tibias sillonnés, tarsi biarticulés.

Ce nouveau genre par ses antennes de cinq articles se rapproche de *Encosternum* Spinola. Grâce à l'extrême obligeance de M. Schouteden, de Bruxelles, qui a bien voulu me communiquer un exemplaire de *E. Delegorguei* Spinola, j'ai pu faire une utile comparaison. *Empysarus* diffère de *Encosternum* par la forme subarrondie, plane, foliacée de son corps, par la structure de ses antennes, dont le second article est une fois et demie plus long que le premier, tandis que ce même article est plus de deux fois plus court que le premier chez *Encosternum*. Chez *Empysarus*, l'épine

ventrale est étroite, allongée, aiguë et s'engage dans une profonde échancrure métasternale; dans le genre de Spinola, l'épine est courte, à sommet arrondi. Par sa forme générale, notre genre se rapprocherait de *Cyclogaster* Westwood et de *Cyclogastridea* Reuter, mais ces derniers en diffèrent essentiellement par leurs antennes de quatre articles.

Empysarus depressus nov. sp.

De couleur variable, ochracée pâle mêlé de verdâtre, sur l'écusson et le disque des élytres ou d'un ochracé ferrugineux par places. Tête et pronotum densément ponctués et faiblement ridés; écusson finement et moins densément ponctué, non ridé, muni d'une callosité triangulaire lisse, bien apparente aux angles basilaires. Abdomen très finement bordé de noir sur la tranche; en dessous de la couleur du dessus, très finement ponctué, plus grossièrement sur les côtés. Bord apical du sixième segment abdominal assez profondément sinué. Segment génital mâle caréné, à bord apical arrondi et muni de deux impressions larges peu profondes de chaque côté de la ligne médiane près du bord apical. Segment génital femelle à lames basales latérales convexes tangentes sur la ligne médiane et un peu déprimées sur cette ligne; lame génitale apicale plane, à angles basilaires droits.

♂ long. 22 mm. 5; larg. max. abdom. 14 millimètres.

♀ long 23 – 25 millimètres; larg. prothor. 11.5 – 12 millimètres; larg. max. abdom. 14 – 16 millimètres.

Inde: monts Kodikanel et Trichinopoly. Collection Noudhier au Muséum de Paris.

CATALOGUE DES SCOLOPENDRIDES

DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

(COLLECTION DU MUSÉUM DÉTERMINÉE

PAR M. LE PROFESSEUR KARL KRAEPLIN, ET COLLECTION H. W. BRÖLEMANN).

DEUXIÈME PARTIE. — Genre **Scolopendra**.

SCOLOPENDRA GIGANTEA Linné. — Chili : [Expéd. de la *Vénus*] sept. (Né-
boux, 1839). — Pérou (Senez, 1879). — Pérou : prov. de Huara-
chiri, Pueblo de Cocachacra, [1892] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
— Brésil (F. Fuchs, 1884). — Venezuela : Naricual (Chaper,
1885). — Colombie : Carthagène (Barrot, 1835. — *Scolop. gigantea*
L. var. insignis Gervais, Type). — Orénoque (Chaper, 1889; Claf-
fanjon, 1887). — Trinidad (E. Brosse, 1869).